

Употреба

Novalac AC е храна, специално разработена, за да отговори на хранителните нужди на бебета с колики под формата на коремна болка, метеоризъм и подуване на корема поради намалена толерантност към лактоза. Novalac AC има намалено съдържание на лактоза, което ограничава чревната ферментация или появата на коремна болка, метеоризъм и подуване на корема. Novalac AC може да се използва като единствен източник на хранене, докато бебето навърши 6 месеца, ако те не са на майчина кърма. След 6-месечна възраст можете да използвате Novalac AC като част от разнообразна диета, която трябва постепено да въвеждате съветите на вашия лекар.

Важна забележка

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета. Използвайте Novalac AC само под лекарско наблюдение и само при бебета, които проявяват симптомите, за които продуктът е предназначен. Не използвайте продукта като единствен източник на храна след 6-месечна възраст и/или в случай на галактоземия. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac AC е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имуни отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилното приготвяне или съхранение може да представлява риск за здравето. Novalac AC не е подходящ за парентерална употреба или за хранене през тръба. Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Брой хранения на ден	6	5	5	4	3*	2*
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7	7	8
Количество вода (ml)	90	120	150	210	210	240

* като част от разнообразното хранене

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac AC. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

200008236

Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.

• Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина. • Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия. • След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба. • Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария • Държава на произход: Германия • Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31



MEDIS

www.novalac.bg

Novalac AC

Храна за специални медицински цели

За диетотерапия при колики под формата на коремна болка, метеоризъм и подуване на корема



намалено съдържание на лактоза

0-36 месеца

400 g e

Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
	kJ	2103
	kcal	502
	g	25
Мазнини		
От които		
- наситени	g	11,7
- Лъволова киселина	g	4,5
- Алфа-линоленова киселина	mg	405
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30
Белтъци	g	58,1
От които		
- захарни от които:	g	18,6
- лактоза	g	18
GOS (галакто-олигосахариди)	g	1,85
Влакнини	g	1,2
Белтъци	g	10,4
Сол	g	0,475
Витамици		
Витамин A	µg RE	440
Витамин D	µg	11,5
Витамин E	mg	8,7
Витамин K	µg	60
Витамин C	mg	60
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,8
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1,2
Ниацин	mg	4,5
Витамин B6	mg	0,5
Фолиева киселина	µg	85
Фолат	µg DFE	150
Витамин B12	µg	1,5
Биотин	µg	18
Пантотенова киселина	mg	5
Минерали		
Натрий	mg	190
Калий	mg	590
Хлорид	mg	400
Калций	mg	500
Фосфор	mg	335
Магний	mg	40
Желязо	mg	5
Цинк	mg	3,5
Мед	mg	0,38
Манган	mg	0,035
Флуорид	mg	<0,45
Селен	µg	26
Хром	mg	<45
Молибден	µg	<45
Иод	µg	95
Холин	mg	170
Инозитол	mg	80
Таурин	mg	40
L-карнитин	mg	20

Съставки

Обезмаслено мляко, малтодекстрин, растителни мазнини (палмово, соево, кокосово), галакто-олигосахариди (мляко), лактоза, рибеино масло (DHA) (мляко), калциеви соли на лимонената киселина, холин битартрат, емулгатор (соев лецитин), натриев хлорид, витамини (натриев аскорбат, DL-алфа токоферол ацетат, калциев D-пантотенат, никотинамид, аскорбинова киселина, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинил ацетат, пиридоксин хидрохлорид, фолиева киселина, фитоменадион, холекалциферол, D-биотин, цианокобаламин), инозитол, железен фосфат, L-цистин, L-триптофан, калиев хлорид, калиев хлорид, млечнокисели култури (B. lactis, L. rhamnosus), масло от Mortierella alpina (ARA) (мляко), калциеви соли на ортофосфорната киселина, таурин, натриеви соли на ортофосфорната киселина, L-карнитин, магнезиев оксид, цинков сулфат, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол), натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат, калиеви соли на лимонената киселина, натриеви соли на лимонената киселина.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с бибера на във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжица, сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.